



# Birk & Barfod

## Bier og sommerfugle - 100% urter

*Insektvenlige urter til havejord*

Denne blanding indeholder 27 flerårige bi- og sommerfuglevenlige urter, som trives på almindelig havejord.

**1-årige urter:** Kornblomst, *Centaurea cyanus*. Gærdevalmue, *Papaver dubium*.

**2-årige urter:** Vild gulerod, *Daucus carota*. Almindelig bjørneklo, *Heracleum sphondylium*. Blåmunke, *Jasione montana*. Vild kørvel, *Anthriscus sylvestris*.

**Flerårige urter:** Almindelig røllike, *Achillea millefolium*. Liden klokke, *Campanula rotundifolia*. Almindelig knopurt, *Centaurea jacea*. Hvid snerre, *Galium album*.

**Prikbladet perikon,** *Hypericum perforatum*. **Almindelig kongepen,** *Hypochaeris radicata*. **Blåhat,** *Knautia arvensis*. **Hvid Okseøje,** *Leucanthemum vulgare*.

**Kællingetand,** *Lotus corniculatus*. **Trævekroner,** *Lychnis flos-cuculi*. **Moskuskatost,** *Malva moschata*. **Humlesneglebælg,** *Medicago lupulina*. **Lancetvejbred,** *Plantago lanceolata*. **Brunelle,** *Prunella vulgaris*. **Bidende ranunkel,** *Ranunculus acris*.

**Almindelig syre,** *Rumex acetosa*. **Høstborst,** *Scorzoneroideis autumnalis*.

**Blæresmælde,** *Silene vulgaris*. **Dagpragtstjerne,** *Silene dioica*. **Græsbladet fladstjerne,** *Stellaria graminea*. **Eng-gedeskæg,** *Tragopogon pratensis*.

Urter 100%

Denne blanding er KUN med arter der hører til i vores biogeografiske region, og fra avlere som opfylder ENSPA-kriterierne (European Native Seed Producers Association).

### Såvejledning

Sørg for at jorden er rensed for enårigt og flerårigt ukrudt, og at jorden er blød og gennemarbejdet. Riv jorden over, for at få en plan overflade.

Det kan være en hjælp at blande frøene op med sand eller frøfyld, for at lette udsåningen. Er området større, så del frømængden i to, og så en halvdel ad gangen. Riv let igennem igen, for at dække frøene med et par millimeter jord. Pres med bagsiden af riven eller kø over med en tromle, så frøene får jordkontakt.

Vanding: Frøene begynder at spire når de vandes. Det er vigtigt at holde dem fugtige i hele spireperioden på 2-3 uger. Efter 2-3 uger kan der vandes efter behov, fx én gang om ugen hvis ikke der kommer regn.

**Optimale så-tidspunkter: marts-april og august-oktober**