



Birk & Barfod

Lutter urter

100% hjemmehørende urter

Denne blanding indeholder 36 forskellige en- og flerårige blomstrende insektvenlige arter, som trives i almindelig havejord.

Urter: Alm. røllike, *Achillea millefolium*. Alm. vinterkarse, *Barbara vulgaris*. Smalbladet klokke, *Campanula persicifolia*. Kornblomst, *Centaurea cyanus*. Alm. knopurt, *Centaurea jacea*. Vild gulerod, *Daucus carota*. Slangehoved, *Echium vulgare*. Hvid snerre, *Galium album*. Alm. bjørneklo, *Heracleum sphondylium*. Prikbladet perikon, *Hypericum perforatum*. Alm. kongepen, *Hypochaeris radicata*. Blåhat, *Knautia arvensis*. Hvid okseøje, *Leucanthemum vulgare*. Alm. torskemund, *Linaria vulgaris*. Sump-kællingetand, *Lotus pendunculatus*. Moskus-katost, *Malva moschata*. Alm. katost, *Malva sylvestris*. Gærde-valmue, *Papaver dubium*. Korn-valmue, *Papaver rhoeas*. Alm. pastinak, *Pastinaca sativa*. Lancet-vejbred, *Plantago lanceolata*. Sølv-potentil, *Potentilla argentea*. Alm. brunelle, *Prunella vulgaris*. Alm. sæbeurt, *Saponaria officinalis*. Høst-borst, *Scorzoneraoides autumnalis*. Knoldet brunrod, *Scrophularia nodosa*. Dagpragtstjerne, *Silene dioica*. Aftenpragtstjerne, *Silene latifolia* ssp. *alba*. Blæresmælde, *Silene vulgaris*. Ager-sennep, *Sinapis arvensis*. Alm. gyldenris, *Solidago virgaurea*. Rejnfan, *Tanacetum vulgare*. Bredbladet timian, *Thymus pulegioides*. Eng-gedeskæg, *Tragopogon pratensis*. Mørk kongelys, *Verbascum nigrum*. Agerstedmoderblomst, *Viola arvensis*.

Urter: 100%

Denne blanding er KUN med arter der hører til i vores biogeografiske region, og fra avlere som opfylder ENSPA-kriterierne (European Native Seed Producers Association).

Såvejledning

Sørg for at jorden er renset for enårigt og flerårigt ukrudt, og at jorden er blød og gennemarbejdet. Riv jorden over, for at få en plan overflade.

Det kan være en hjælp at blande frøene op med sand eller frøfyld, for at lette udsåningen. Er området større, så del frømængden i to, og så en halvdel ad gangen. Riv let igennem igen, for at dække frøene med et par millimeter jord. Pres med bagsiden af riven eller kør over med en tromle, så frøene får jordkontakt.

Vanding: Frøene begynder at spire når de vandes. Det er vigtigt at holde dem fugtige i hele spireperioden på 2-3 uger. Efter 2-3 uger kan der vandes efter behov, fx én gang om ugen hvis der ikke kommer regn.

Optimale så-tidspunkter: marts-april og august-oktober